



Guide d'identification des espèces marines

Communes de la baie de Fundy et du plateau néo-écossais

Table des matières

Gros mammifères

[Rorqual bleu \(*Balaenoptera musculus*\)](#)

[Rorqual commun \(*Balaenoptera physalus*\)](#)

[Rorqual boréal \(*Balaenoptera borealis*\)](#)

[Petit rorqual \(*Balaenoptera acutorostrata*\)](#)

[Baleine noire de l'Atlantique Nord \(*Eubalaena glacialis*\)](#)

[Rorqual à bosse \(*Megaptera novaeangliae*\)](#)

[Cachalot \(*Physeter macrocephalus*\)](#)

[Baleine à bec commune \(*Hyperoodon ampullatus*\)](#)

[Globicéphale noir \(*Globicephala melas*\)](#)

[Épaulard \(*Orcinus orca*\)](#)

[Marsouin commun \(*Phocoena phocoena*\)](#)

[Dauphin commun \(*Delphinus delphis*\)](#)

[Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique \(*Lagenorhynchus acutus*\)](#)

[Dauphin à nez blanc \(*Lagenorhynchus albirostris*\)](#)

Autres espèces de grande taille

[Tortue luth \(*Dermochelys coriacea*\)](#)

[Caouanne \(*Caretta caretta*\)](#)

[Requin-pèlerin \(*Cetorhinus maximus*\)](#)

[Môle commun \(*Mola Mola*\)](#)



Gros mammifères

Rorqual bleu (*Balaenoptera musculus*)



A



B

Haute expulsion d'air en forme de colonne pouvant atteindre 10 m

ÉNORMES

Longueur maximale de 32 m

Tacheté de bleu et de gris

Habituellement solitaire ou en petits groupes

Tête plate en U avec grande surface d'éclaboussement devant l'évent



B

Petite nageoire dorsale, vers l'extrémité du corps




B

Lève souvent sa nageoire caudale lorsqu'il plonge

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Rorqual bleu](#)



Rorqual commun (*Balaenoptera physalus*)



Haute expulsion d'air en forme de colonne pouvant atteindre 6 m

Longueur maximale de 23 m
Seul le côté droit de sa mâchoire inférieure est blanc
Peut sauter hors de l'eau à l'occasion




L'évent fait brièvement surface avant que la nageoire dorsale émerge
Lève rarement sa nageoire caudale lorsqu'il plonge

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Rorqual commun](#)



Rorqual boréal (*Balaenoptera borealis*)



A



B

Haute expulsion d'air en forme de colonne pouvant atteindre 4,5 m

Longueur maximale de 19 m
Habituellement solitaire ou en petits groupes
Cicatrices blanches ovales souvent visibles




B

La nageoire dorsale et l'évent apparaissent simultanément
Arque rarement le dos et lève rarement sa nageoire caudale lorsqu'il plonge
Peut souffler plusieurs fois puis plonger pour une courte période

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Rorqual boréal](#)



Petit rorqual (*Balaenoptera acutorostrata*)



Expulsion d'air épaisse jusqu'à 2,5 m; seulement visible par temps frais


Longueur maximale de 9 m
Habituellement solitaire ou en petits groupes
Museau très pointu
Bande blanche sur la nageoire



La nageoire dorsale est grande et son extrémité est très pointue et orientée légèrement vers l'arrière
Lève rarement sa nageoire caudale lorsqu'il plonge
Saute rarement hors de l'eau



Baleine noire de l'Atlantique Nord (*Eubalaena glacialis*)



B


Expulsion d'air jusqu'à 3 et 5 m
en forme de V

Longueur maximale de 17 m

Souvent à la surface, au repos
ou socialisant

Noire avec des callosités
blanches sur la tête

Dos large sans nageoire dorsale



C


Grande nageoire triangulaire

Lève sa nageoire caudale
lorsqu'elle plonge

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Baleine noire de l'Atlantique Nord](#)



Rorqual à bosse (*Megaptera novaeangliae*)



A



B

Expulsion d'air jusqu'à 3 m, en forme arrondie et basse

Longueur maximale de 18 m
Habituellement solitaire ou en petits groupes

Tubercules blancs sur la tête et à la mâchoire inférieure

Nageoires pectorales extrêmement longues présentant des marques blanches variées



B

Nageoire caudale dentelée le long du flanc arrière accompagnée de marques blanches sous le ventre

Lève souvent sa nageoire caudale lorsqu'il plonge

Capable d'acrobacies : saut hors de l'eau, frappement de l'eau avec la queue, saut d'observation

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Rorqual à bosse](#)



Cachalot (*Physeter macrocephalus*)



Expulsion d'air jusqu' à 2.4 m
dirigée vers l'avant sur la gauche
du devant de la tête

Longueur maximale de 18 m

Habituellement au large,
solitaire ou en petits groupes

Grosse tête carrée

Pas de nageoire dorsale, mais
une protubérance suivie d'une
rangée de bosses sur le dos en
allant vers la queue



Soulève sa nageoire caudale avant
d'effectuer un plongeon en
profondeur qui peut durer de 30 à
60 minutes

Nageoire caudale souvent
dentelée le long du flanc arrière



Baleine à bec commune (*Hyperoodon ampullatus*)



Expulsion d'air épaisse et basse
B

Longueur maximale de 9 m

Habituellement au large en
petits groupes

Bec caractéristique

Les femelles ont le front
bulbeux

Les mâles ont le front blanc et
aplati

Brun jaunâtre tirant sur le gris



Nageoire dorsale en forme de
faucille



Nageoire caudale soulevée pour
un plongeon en profondeur

Nageoire caudale foncée, large,
rarement entaillée

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Baleine à bec commune](#)



Globicéphale noir (*Globicephala melas*)



B



B

Jet d'air puissant, mais difficile à voir, d'environ 1,5 m de hauteur

Longueur maximale de 6 m

Souvent aperçu en groupe de 20 à 50 individus

Tête bulbeuse

Longues nageoires pectorales en forme de fauille

Brun foncé ou noir



B

B

Nageoire dorsale fortement recourbée vers l'arrière

Sauts d'observation fréquents

Les jeunes s'amusent en surface



Épaulard (*Orcinus orca*)



	<p>Longueur maximale de 9 m</p> <p>Observé en groupes de 4 à 10 individus tendant à faire surface ensemble</p> <p>Fait parfois des sauts d'observation, se sert de sa queue pour frapper la surface de l'eau puis saute hors de l'eau</p> <p>Noir et blanc vifs</p> <p>Nageoires en forme de pagaille</p>	<p>Les mâles ont une très grande nageoire dorsale triangulaire</p> <p>Les femelles ont une grande nageoire dorsale courbée</p>
--	---	--

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Épaulard](#)



Marsouin commun (*Phocoena phocoena*)



A

Longueur maximale de 1,5 m

Nageoire dorsale triangulaire au centre du corps

Dos gris, flancs et ventre plus clairs

Petit corps massif

Individus seuls ou en petits groupes fréquemment observés sur la côte

Il n'est possible de l'apercevoir que très brièvement, plonge pendant 3 à 6 minutes

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Marsouin commun](#)



Dauphin commun (*Delphinus delphis*)



Longueur maximale de 2,7 m

Grande nageoire dorsale foncée avec une zone claire au centre

Bande foncée sous la nageoire dorsale

Bec noir caractéristique

Souvent vu sautant hors de l'eau ou se laissant porter par la vague

Plus fréquent au large, en grands groupes



Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique (*Lagenorhynchus acutus*)



Longueur maximale de 2,7 m

Nageoire dorsale en forme de faucille

Petit bec noir

Tache blanche pleine sur les flancs, bande brun clair se prolongeant presque jusqu'à la nageoire caudale

Groupes de 20 à 50 individus dans la zone côtière en été



Dauphin à nez blanc (*Lagenorhynchus albirostris*)



A

Longueur maximale de 3,1 m

Grande nageoire dorsale en forme de fauille

Foncé avec des taches claires diffuses sur les flancs

Bec blanc caractéristique

Groupes de 5 à 25 individus dans la zone côtière en été

Nageur bruyant qui plonge en éclaboussant



Autres espèces de grande taille

Tortue luth (*Dermochelys coriacea*)



B

Longueur maximale de 2,5 m

Tache rosâtre sur le dessus de la tête

Carapace ayant l'aspect du cuir

Crêtes longitudinales proéminentes sur le dos

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Tortue luth](#)



Caouanne (*Caretta caretta*)



B

Longueur maximale de 1 m

Grosse tête


Carapace épaisse en forme de cœur

Brun rougeâtre

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Tortue caouanne](#)



Requin-pèlerin (*Cetorhinus maximus*)



B

Longueur maximale de 10 m

Saute hors de l'eau

Grandes fentes branchiales

Très grand requin

Nage avec la nageoire dorsale au-dessus de la surface

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez [Requin-pèlerin](#)



Môle commun (*Mola Mola*)



B

Longueur maximale de 3 m

Se prélasser souvent à la surface sur son flanc

Forme circulaire, sans queue apparente

Gris brunâtre avec un ventre blanc



VEUILLEZ ENVOYER LES DÉTAILS DES ANIMAUX OBSERVÉS, notamment la date, les coordonnées, les espèces, le nombre, les caractéristiques propres et le degré de certitude, ainsi que les photographies.

Pour signaler des observations d'animaux vivants et en santé :

- Mammifères marins et baleines

XMARWhalesightings@dfo-mpo.gc.ca

1-844-800-8568

Application mobile Whale Alert : <http://www.whalealert.org/>

- Tortues de mer

Canadian Sea Turtle Network

info@seaturtle.ca

1-888-729-4667

Pour signaler des observations d'animaux enchevêtrés, blessés ou morts :

- Marine Animal Response Society

1-866-567-6277

marineanimalresponse@gmail.com

Bande radio VHF 16



Pour signaler des activités illégales :

- Échec au crime
1-800-222-TIPS (8477)
- Pêches et Océans Canada (par l'intermédiaire du Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne)
1-800-565-1633

A Source de l'illustration : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2012, archives

B Source de l'illustration : Paul Vecsei