

Figure 14a. Seasonal distribution of catches (kg) of thorny skate (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 14a. Distribution saisonnière des prises (kg) de raie épineuse (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 14b. Seasonal distribution of catches (#'s) of large ( $\geq 50$  cm) thorny skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 14b. Distribution saisonnière des prises (#) de raie épineuse de grande taille ( $\geq 50$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 14c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small ( $< 50$  cm) thorny skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 14c. Distribution saisonnière des prises (#) de raie épineuse de petite taille ( $< 50$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 15a. Seasonal distribution of catches (kg) of winter skate (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 15a. Distribution saisonnière des prises (kg) de raie tachetée (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 15b. Seasonal distribution of catches (#'s) of large ( $\geq 50$  cm) winter skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 15b. Distribution saisonnière des prises (#) de raie tachetée de grande taille ( $\geq 50$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 15c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small ( $< 50$  cm) winter skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 15c. Distribution saisonnière des prises (#) de raie tachetée de petite taille ( $< 50$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 16a. Seasonal distribution of catches (kg) of smooth skate (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 16a. Distribution saisonnière des prises (kg) de raie à queue de velours (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 16b. Seasonal distribution of catches (#'s) of large ( $\geq 50$  cm) smooth skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 16b. Distribution saisonnière des prises (#) de raie à queue de velours de grande taille ( $\geq 50$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 16c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 50 cm) smooth skate in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 16c. Distribution saisonnière des prises (#) de raie à queue de velours de petite taille (< 50 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 17a. Seasonal distribution of catches (kg) of Atlantic wolffish (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 17a. Distribution saisonnière des prises (kg) de loup atlantique (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 17b. Seasonal distribution of catches (#'s) of large ( $\geq 55$  cm) Atlantic wolffish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 17b. Distribution saisonnière des prises (#) de loup atlantique de grande taille ( $\geq 55$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 17c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small ( $< 55$  cm) Atlantic wolffish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 17c. Distribution saisonnière des prises (#) de loup atlantique de petite taille ( $< 55$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 18a. Seasonal distribution of catches (kg) of longhorn sculpin (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 18a. Distribution saisonnière des prises (kg) de chabotisseau à dix-huit épines (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 18b. Seasonal distribution of catches (#'s) of large ( $\geq 21$  cm) longhorn sculpin in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 18b. Distribution saisonnière des prises (#) de chabotisseau à dix-huit épines de grande taille ( $\geq 21$  cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 18c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 21 cm) longhorn sculpin in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 18c. Distribution saisonnière des prises (#) de chabotisseau à dix-huit épines de petite taille (< 21 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 19. Seasonal distribution of catches (kg) of all marine fish species (all sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 19. Distribution saisonnière des prises (kg) de toutes les espèces de poissons marins (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.