


Requins de la Colombie-Britannique

Pêches et Océans Canada souhaite compiler les données sur les prises accessoires les plus justes qui soient et assurer la conservation des espèces de requins dans les eaux de la Colombie-Britannique. L'information contenue dans le présent guide a pour but d'aider le département à assurer un suivi des prises accessoires et d'aider les pêcheurs à identifier correctement les prises accessoires et à les consigner dans les journaux de bord.

Les dessins ne sont pas à l'échelle.

A

TAUPE DU PACIFIQUE



Fréquent

H


HOLBICHE BRUNE



Fréquent

B


REQUIN BLEU



Fréquent

I

AIGUILLAT COMMUN



Fréquent

C


LAIMARGUE DU PACIFIQUE



Fréquent

J


MILANDRE



Fréquent

D


REQUIN-TAUPE BLEU



Rare

K


REQUIN À SEPT BRANCHIES



Rare

E


RENARD DE MER



Rare

L


ANGE DE MER DU PACIFIQUE



Rare

F

REQUIN GRISET



Fréquent

M


REQUIN LANTERNE



Non confirmé

G


PÈLERIN



Rare

N

GRAND REQUIN BLANC



Rare

Requins de la Colombie-Britannique

Les requins pélagiques vivent dans les couches supérieures de la mer libre. Les requins benthiques vivent sur le plancher sous-marin ou à proximité de celui-ci. Les silhouettes montrent la taille relative de chaque espèce de requin.

- A TAUPE DU PACIFIQUE** *Lamna ditropis*
• Pélagique (de la surface jusqu'à 375 m)
• Jusqu'à 3 m (10 pi) de longueur
• Corps court et massif; museau court
• Noir ou gris foncé sur le dessus; démarcation soudaine avec taches blanches sur le dessous
• Deux carènes horizontales juste avant la nageoire caudale
• Dents en forme d'alène avec de petits denticules pointus de chaque côté de la pointe principale
- B REQUIN BLEU** *Prionace glauca*
• Eaux de surface
• Jusqu'à 3 m (10 pi) de longueur
• Bleu indigo foncé sur le dos; dégradation vers le bleu clair éclatant sur les côtés et le blanc sur le dessous
• Remarquable par sa grande nageoire pectorale arquée
• Museau bien développé; corps élancé
- C LAIMARGUE DU PACIFIQUE** *Somniosus pacificus*
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu'à 245 m)
• Jusqu'à 4,3 m (14 pi) de longueur
• Brun noirâtre partout ou vert ardoise avec taches allongées plus foncées
• Pédoncule caudal court (partie étroite du corps d'un poisson à laquelle la nageoire caudale est rattachée)
- D REQUIN-TAUPE BLEU** *Isurus oxyrinchus*
• Pélagique (de la surface jusqu'à 740 m)
• Jusqu'à 4 m (13 pi) de longueur
• Grands yeux noirs, museau pointu, grandes dents étroites recourbées avec bords lisses
• Bleu foncé sur le dessus, blanc sur le dessous; dessous du museau et de la mâchoire blanc
• Deuxième nageoire dorsale et nageoire anale minuscules
- E RENARD DE MER** *Alopias vulpinus*
• Pélagique (de la surface jusqu'à 366 m)
• Jusqu'à 5,8 m (19 pi) de longueur
• Nageoire caudale supérieure de plus de la moitié de la longueur de l'individu
• Coloration brune
• Yeux modérément grands
- F REQUIN GRISET** *Hexanchus griseus*
• Benthique (de la surface jusqu'à 2307 m)
• Jusqu'à 4,8 m (16 pi) de longueur
• Brun foncé ou gris sur le dessus, presque noir chez certains individus, un peu plus pâle en-dessous
• Six longues fentes branchiales de chaque côté
• Deux rangées de dents; dents de taille moyenne sur la mâchoire supérieure et de plus grande taille sur la mâchoire inférieure
• Espèce désignée comme étant Préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
- G PÈLERIN** *Cetorhinus maximus*
• Eaux de surface
• Jusqu'à 10 m (33 pi) de longueur
• Brun grisâtre à gris d'ardoise ou noir; dégradation vers le blanc sur la surface ventrale
• Fentes branchiales très longues qui font presque le tour de la tête
• Peignes de branchicténies cornées
• Dents petites et nombreuses
• Carène horizontale forte juste avant la nageoire caudale
• Espèce désignée comme étant En voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
- H HOLBICHE BRUNE** *Apristurus brunneus*
• Pélagique et benthique (de 33 à 950 m)
• Jusqu'à 68 cm (2,2 pi) de longueur
• Brun clair ou moyen éclatant uniforme sur tout le corps
• Marges foncées sur les nageoires
• Première nageoire dorsale postérieure par rapport à la nageoire pelvienne
• Deux nageoires dorsales de taille égale
- I AIGUILLAT COMMUN** *Squalus suckleyi*
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu'à 1460 m)
• Jusqu'à 1,6 m (5 pi) de longueur
• Surface dorsale allant de gris ardoise à brun
• Surface ventrale allant de blanc à gris clair
• Deux nageoires dorsales avec épine antérieure
• Aucune nageoire anale
- J MILANDRE** *Galeorhinus galeus*
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu'à 471 m)
• Jusqu'à 2 m (6,5 pi) de longueur
• Gris sombre sur la surface dorsale, de plus pâle à blanc sur la surface ventrale
• Deuxième nageoire dorsale directement au-dessus de la nageoire anale
• Taches noires sur les nageoires des juvéniles
• Corps mince, museau long
• Aucune carène sur le pédoncule caudal
• Espèce désignée comme étant Préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
- K REQUIN À SEPT BRANCHIES** *Notorynchus cepedianus*
• Benthique (de 135 à 570 m)
• Jusqu'à 3 m (10 pi) de longueur
• Gris-sable au brun rougeâtre, avec taches noires rondes dispersées
• Sept fentes branchiales de chaque côté
• La plupart des dents de la mâchoire supérieure ont une cuspide dominante courbée vers l'intérieur
• Dans la mâchoire inférieure, chaque dent comporte une série de cuspides
- L ANGE DE MER DU PACIFIQUE** *Squatina californica*
• Benthique (3 à 183 m)
• Jusqu'à 1,5 m (5 pi) de longueur
• Apparence distinctive, corps aplati, grandes nageoires pectorales
• Gris à brun avec des taches foncées éparses, blancs en dessous
• Grande bouche terminale avec barbillons sur la marge antérieure
- M REQUIN LANTERNE** *Etmopeteridae*
• Espèces à confirmer - retenir les spécimens
• Benthique (400 à plus 1,000 m)
• Petite taille, moins de 1 m (3 pi)
• Brun foncé à noir
• Cinquième fente branchiale plus petite que les quatre autres
• Pas de nageoire anale
• Deux nageoires dorsales, même taille ou premier plus petit que le deuxième
• Deux épines dorsales distinctes
- N GRAND REQUIN BLANC** *Carcharodon carcharias*
• Pélagique (de la surface jusqu'à 1280 m)
• Jusqu'à 6 m (19 pi) de longueur
• Brun ardoise ou gris à presque noir sur le dessus; dégradation jusqu'à un blanc crème sur le dessous
• Nageoire caudale en forme de croissant
• Dents triangulaires dentelées

En cas de doute quant à l'identification d'un spécimen, veuillez prendre une photographie et communiquer avec le Pêches et Océans Canada. Pour plus de renseignements, communiquez avec Jackie King, Ph.D., Jackie.King@dfo-mpo.gc.ca ou visitez: www.pac.dfo-mpo.gc.ca/science/species-especes/elasmobranch/index-fra.htm

Publié par Pêches et Océans Canada
Ottawa, Ontario, K1A 0E6
Also available in English.

MPO/2011-1707 N° de cat. Fs144-25/2011F
ISBN 978-1-100-96511-6
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada 2011