

Identification des requins au Canada atlantique

Il existe plus de 20 espèces de requins dans les eaux du Canada atlantique, dont plusieurs sont considérées en péril. En tant que prédateurs dominants, les requins jouent un rôle important dans le maintien d'écosystèmes sains. Ci-dessous se trouvent huit espèces distinctes de requins que l'on trouve dans nos eaux.

Requin blanc



Longueur à l'âge adulte : de 2,5 m à plus de 6 m (de 8 pi à plus de 20 pi)

Statut de conservation : En voie de disparition (*Loi sur les espèces en péril*)

Les requins blancs ont un gros corps arrondi et une queue en forme de croissant. Ils sont gris ou brunâtres sur le dessus, avec un ventre blanc. Ils ont une nageoire dorsale en forme de triangle et les extrémités du dessous des nageoires pectorales sont noires.

Les requins blancs peuvent être curieux et pourraient être attirés par les bateaux ou d'autres objets dans l'eau. Il est peu susceptible qu'ils sautent hors de l'eau, mais peuvent le faire lorsqu'ils chassent de gros poissons ou des mammifères marins.

Requin du Groenland



Longueur à l'âge adulte : de 3,5 m à 5 m (de 11 pi à 16 pi)

Statut de conservation : Non évalué

Le corps du requin du Groenland est épais, brun ou gris, avec, parfois, des taches blanches ou des stries noires sur le dos. Ils ont de petits yeux, de petites nageoires pectorales et dorsales et une nageoire caudale asymétrique.

Les requins du Groenland sont léthargiques et se déplacent lentement. Ils peuvent se nourrir de carcasses et ont été observés près de bateaux de pêche.

Requin-taube bleu



Longueur à l'âge adulte : de 1,5 m à 4 m (de 5 pi à 13 pi)

Statut de conservation : En voie de disparition (COSEPAC)

Les requins-taupes bleus ont un ventre blanc, et sont bleu métallique sur le dessus. Ils ont un museau svelte et pointu, une queue en forme de croissant et des nageoires pectorales relativement courtes.

Les requins-taupes bleus peuvent sauter jusqu'à 6 mètres (20 pieds) hors de l'eau, et sont réputés pour être très actifs lorsqu'ils sont à l'hameçon.



Requin bleu



Longueur à l'âge adulte : de 2 m à 3,8 m (de 6,5 pi à 12,5 pi)

Statut de conservation : N'est pas en péril (COSEPA)

Les requins bleus ont un corps long et mince, de couleur bleu foncé sur le dessus et blanc en dessous. Ils ont de grands yeux, un long museau et de longues nageoires pectorales étroites. Le lobe supérieur de leur queue est plus grand que le lobe inférieur. Le requin bleu est le plus commun des grands requins que l'on rencontre en mer, et il est connu pour se débattre convulsivement lorsqu'il est pris à un hameçon.

Requin-pèlerin



Longueur à l'âge adulte : de 9 m à 12 m (29,5 pi à 39 pi)

Statut de conservation : Espèce préoccupante (COSEPA)

Le corps du requin-pèlerin est brun-grisâtre, souvent moucheté. Ils ont un museau pointu, une bouche extrêmement grande et cinq fentes branchiales massives. La première nageoire dorsale est arrondie et située très en arrière sur le corps. Ils ont tendance à se prélasser à la surface et sont facilement approchables par de petits bateaux.

Aiguillat noir



Longueur à l'âge adulte : de 0,6 m à 0,85 m (de 2 pi à 2,8 pi)

Statut de conservation : Non évalué

L'aiguillat noir a un corps costaud noir ou brun. Ils ont une épine sur le bord avant de chaque nageoire dorsale.

L'aiguillat noir est un requin d'eau profonde rarement rencontré, bien qu'il soit parfois capturé accidentellement à la palangre ou par des chaluts en eaux profondes.

Maraîche




Longueur à l'âge adulte : de 1,5 m à 3 m (de 5 pi à 10 pi)

Statut de conservation : En voie de disparition (COSEPA)

Les maraîches ont un corps trapu, bleu-gris sur le dos et blanc en dessous. Ils ont de grands yeux foncés et un museau court et arrondi. Ils ont une tache blanche sur la bordure postérieure de leur première nageoire dorsale. Ils sont réputés pour se débattre lorsqu'ils sont à l'hameçon.

Aiguillat commun



Longueur à l'âge adulte : de 0,75 m à 1,3 m (de 2,5 pi à 4 pi)

Statut de conservation : Espèce préoccupante (COSEPA)

L'aiguillat commun a un corps gris ou brun, souvent avec des taches blanches, et un ventre gris pâle ou blanc. Ils ont une épine sur le bord avant de chaque nageoire dorsale et une queue asymétrique. Ils vivent souvent en banc.